

VALBAZEN® 10 Cobalto



USO VETERINÁRIO Anti-helmíntico de largo espectro Conteúdo:

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA
BOVINOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 14 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO. LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.
OVINOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 14 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO. LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

FÓRMULA: Cada 100 mL contém:

Albendazole 10,00 g
Sulfato de cobalto 1,35 g
Veículo apropriado q.s.p. 100,00 mL

INDICAÇÕES: Controle e tratamento de endoparasitoses dos bovinos e ovinos causadas por nematódeos gastrintestinais e pulmonares, cestódeos e formas adultas de trematódeos.

DOSAGEM:

- Tratamento de cestódeos, nematódeos gastrintestinais e pulmonares: 5,0 mg de Albendazole e 0,675 mg de sulfato de cobalto/kg de peso (1 mL de Valbazen® 10 Cobalto/20 kg).
 - Tratamento de trematódeos (*Fasciola hepatica*): 10 mg de Albendazole e 1,350 mg de sulfato de cobalto / kg de peso (2 mL de Valbazen® 10 Cobalto/20 kg).
 - Tratamento de larvas inibidas de *Ostertagia*: 7,5 mg de Albendazole e 1,012 mg de sulfato de cobalto/kg de peso (1,5 mL de Valbazen® 10 Cobalto/20 kg).
- A tabela a seguir pode ser usada como indicador de dosagens:

kg de peso a ser tratado	Cestódeos, nematódeos gastrintestinais e pulmonares (dose em mL)	Trematódeos (dose em mL)	Larvas inibidas <i>Ostertagia</i> (dose em mL)
até 20	1	2	1,5
21-40	2	4	3,0
41-60	3	6	4,5
61-80	4	8	6,0
81-100	5	10	7,5
101-120	6	12	9,0
121-140	7	14	10,5
141-160	8	16	12,0

INSTRUÇÕES DE USO:

- Agitar bem antes de usar.
- Administrar por via oral, com pistola dosificadora adequada.

PRECAUÇÕES:

- Não administrar o produto em fêmeas prenhes, nos primeiros 45 dias de gestação.
- Deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

APRESENTAÇÃO:

Embalagens individuais: 100 mL, 1 e 5 litros.
VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 2.220/85 em 14/05/85.

Responsável Técnico:

Renato B. Ferreira – CRMV-SP nº 1.695

Validade do produto: 24 meses após a data de fabricação.

Fabricante: Ipanema Indústria de Produtos Veterinários Ltda.
Rodovia Raposo Tavares, Km 113 - Araçoiaba da Serra - SP

Proprietário:

Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.

Rua Luiz Fernando Rodriguez, 1701
CEP 13064-798 - Campinas - SP
CNPJ 43.588.045/0001-31
SAC 0800 011 1919

zoetis



PART:

FABR:

VENC:

140013271

zoetis