

## ANTIMICROBIANO E ANTI-INFLAMATÓRIO PARA BOVINOS E SUÍNOS

**ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:**

**BOVINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 14 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**LEITE - O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 6 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO, DESTE PRODUTO.**

**SUÍNOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 6 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

### Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Enrofloxacin .....	10,00 g
Piroxicam .....	1,20 g
Veículo q.s.p .....	100,00 mL

### Informações técnicas:

A enrofloxacin pertencente a classe das fluorquinolonas, é um agente bactericida e sua atividade é dependente da concentração. Atua inibindo a DNA girase da bactéria, interferindo no seu metabolismo. Demonstra atividade tanto para agente gram negativos, como para gram positivos.

O piroxicam, derivado do oxicam, é um anti-inflamatório não esteroidal que possui ação analgésica, anti-inflamatória e antipirética. Atua bloqueando a enzima ciclooxigenase (COX-1 e COX-2), inibindo a ativação dos neutrófilos e a síntese de prostaglandinas.

A ação anti-inflamatória do piroxicam, atuando no local da infecção, facilita a ação da enrofloxacin como agente antibacteriano.

### Indicações:

Zelotril Plus é indicado no tratamento de infecções dos bovinos e suínos causadas por bactérias gram negativas e gram positivas:

#### Bovinos:

*Clostridium perfringens*, *Corynebacterium bovis*, *Dichelobacter nodosus*, *Escherichia coli*, *Fusobacterum necrophorum*, *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Salmonella Dublin*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus uberis* e *Trueperella pyogenes*.

#### Suínos:

*Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Actinobaculum suis*, *Bordetella bronchiseptica*, *Clostridium difficile*, *Clostridium perfringens*, *Erysipelotrix rhusiopathiae*, *Escherichia coli*, *Haemophilus parasuis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pasteurella multocida Tipo A*, *Pasteurella multocida Tipo D*, *Salmonella Choleraesuis*, *Salmonella Typhimurium*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus hyicus*, *Streptococcus suis* e *Trueperella pyogenes*.

Espécies	Dose única	Via de Administração
Bovinos e Suínos	1mL a cada 10Kg	Intramuscular

Tratamento em dose única.

A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro a critério do médico veterinário.

**Contraindicações:**

Não utilizar medicamentos após a data de vencimento.

Não utilizar em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

**Interações medicamentosas:**

-Administração concomitante a antibióticos como aminoglicosídeos, cefalosporinas de 3º geração e penicilinas pode apresentar sinergismo, no entanto, com algumas bactérias, em especial *Pseudomonas aeruginosa*, pode não ocorrer. Pode aumentar o risco de nefrotoxicidade.

-Administração concomitante a ciclosporinas pode exacerbar a nefrotoxicidade e reduzir o metabolismo das ciclosporinas (de uso sistêmico).

-Administração concomitante de piroxicam a anticoagulantes pode aumentar o possível risco de sangramento.

-Uso concomitante de piroxicam ao ácido acetilsalicílico e a bifosfonatos (alendronato) podem aumentar o risco de eventos adversos gastrointestinais.

-Em caso de administração com cisplatina pode potencializar a toxicidade renal da mesma.

**Efeitos adversos:**

Podem ocorrer náuseas, vômitos, diarreia e anorexia. Em animais sensíveis podem ocorrer prurido e urticárias.

**Precauções:**

- Quando o volume do produto a ser aplicado ultrapassar 10mL, recomenda-se dividir a quantidade em dois ou mais pontos de aplicação.

- Uso exclusivo em bovinos e suínos na posologia indicada em bula.

- Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.

- Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo.

- Ler a bula atentamente antes de administrar o produto.

- Manter o produto em sua embalagem original.

- Manter o produto livre de contaminações externas.

- A segurança do produto não foi avaliada em animais jovens, fêmeas prenhes ou em lactação.

**Apresentação:**

Frasco ampola contendo 50mL e 100mL.

**Conservação:**

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Período de utilização: Após abertura do frasco, o conteúdo deve ser utilizado em 30 dias.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº SP 000292-5.000034 em 23/12/2013



**UNIÃO QUÍMICA  
FARMACÊUTICA NACIONAL S/A**  
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90  
Embu-Guaçu – SP – CEP: 06900-095  
CNPJ: 60.665.981/0001-18  
Indústria Brasileira

4033384 - 90 X150 mm - PHC 1051



70 mm

70 mm