

Texvet Max Pour On[®]

USO VETERINÁRIO

(*cipermetrina, clorpirifós e butóxido de piperonila*)

CARRAPATICIDA, MOSQUICIDA E BERNICIDA PARA BOVINOS

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 06 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 01 DIA APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTA PRODUTO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE RÓTULO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIO PARA O CONSUMO.



Conteúdo 1 L

FORMULA: Cada 100 mL contém:

Cipermetrina	5,00 g
Clorpirifós	7,00 g
Butóxido de piperonila	1,00 mL
Veículo	100,00 mL

INDICAÇÕES: Texvet Max Pour On é indicado para uso tóxico (pour-on), no combate aos seguintes ectoparasitas que acometem os bovinos: Carrapatos do gênero **Boophilus microplus** (adultos e imaturos). Larvas de **Dermatobia hominis** (berne). Moscas dos gêneros **Haematobia irritans** (adultos) e **Dermatobia hominis** (adultos).

FORMA DE APLICAÇÃO E DOSAGEM: Texvet Max Pour On é uma solução oleosa pronta para uso que deve ser aplicada em toda linha dorsal do animal, vertendo a dose separada no frasco dosador, do pescoço até a anca do animal. A dosagem recomendada é de 10 mL para cada 100 kg de peso vivo, obedecendo a tabela:

Peso corporal (kg)	Volume do produto (mL)
Até 100 kg	10 mL
> 100 – 200 kg	20 mL
> 200 – 300 kg	30 mL
> 300 – 400 kg	40 mL
> 400 – 500 kg	50 mL
> 500 kg	60 mL

INTERVALO ENTRE DOSES: O intervalo entre as aplicações varia de acordo com o programa adotado no controle dos ectoparasitas, condições ambientais, nível de infestação e taxa de reinfestação do rebanho e a critério do Médico Veterinário.

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO: Não aplicar em animais recém-nascidos, debilitados, exaustos, estressados ou doentes. Não administrar em animais com a pele lesionada. Não administrar em animais com hipersensibilidade conhecida aos princípios ativos do produto. Não aplicar o produto nas horas de calor intenso. Não tratar os animais quando há ameaça de chuva. Não aplicar em fêmeas no terço final de gestação.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: A utilização do produto simultaneamente a outros medicamentos à base de organofosforados e carbamatos, deve ser avaliada e observada atentamente pelo médico veterinário, para prevenir a ocorrência de intoxicações. Produtos que ativam os receptores colinérgicos e relaxantes musculares periféricos devem ser evitados quando se fizer uso de organofosforados. Os tranquilizantes fenotiazínicos aumentam a toxicidade dos organofosforados. A succinilcolina e outros agentes bloqueadores neuromusculares podem potencializar os efeitos nicotínicos dos organofosforados.

PRECAUÇÕES: Manter a embalagem fechada. Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto. Produto tóxico para peixes, pássaros e abelhas. Evitar longo contato com a pele, mucosa e a inalação do produto. Lavar as mãos após o manuseio do produto e não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto.

PARTIDA:

FABRICAÇÃO:

VENCIMENTO:

Não guardar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos. Lavar muito bem as mãos e a parte exposta do corpo antes de comer e de beber, e após o trabalho com o produto. Utilizar equipamentos de proteção individual (luvas, máscara, óculos de proteção, gorro e máscara contra gases tóxicos) no momento da aplicação do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Não contaminar rios e outros cursos de água. Caso o produto entre em contato com os olhos, lavá-los imediatamente com água abundante, durante 15 minutos. Caso ocorra intoxicação accidental proceder da seguinte forma: retirar as roupas contaminadas e lavar as partes atingidas do corpo com água e sabão. Em casos de ingestão accidental não provocar vômito e não oferecer leite, gorduras ou óleos ao paciente. Procurar imediatamente atendimento médico, levando consigo o rótulo do produto. Não diluir o produto em óleos.

REAÇÕES ADVERSAS

Na posologia indicada e sob orientação do Médico Veterinário não devem ocorrer intoxicações na espécie para qual o produto é indicado. Os piretróides possuem potente atividade inseticida com baixa toxicidade em mamíferos, geralmente são seguros, mas em caso de intoxicação accidental podem causar alergia, náusea, vômito e dor de cabeça. Os organofosforados, em caso de intoxicação accidental, podem provocar, principalmente, os seguintes efeitos tóxicos: letargia, anorexia, diarreia, polaciúria, vômitos, salvação e tremores musculares.

INFORMAÇÕES PARA USO MÉDICO: Cipermetrina: não existe antídoto específico. O tratamento deve ser sintomático. Clorpirifós: sulfato de atropina e reativadores da colinesterase (contraton ou PAM). Butóxido de Piperonila: não existe antídoto específico. O tratamento deve ser sintomático.

PRAZO DE VALIDADE: 02 (dois) anos após a data de fabricação.

APRESENTAÇÕES: Frasco dosador de 250 mL e 1 L e bombona plástica de 5 L.

Conservar as embalagens fechadas, em local seco e fresco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 9.654 em 09/01/2012. Resp. Técnico: Dr. Nelson Gonçalves de Oliveira CRMV-SP 9010 S

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE

Bimeda Brasil S.A.
Rod. Córrego Cyraco S. Pires, nº 421
Monte Mor/SP - CEP 13190-000
CNPJ 00.328.741/0001-04
SAC 0800 555408
www.bimeda.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA



CUIDADO VENENO