

# Doracide

USO VETERINÁRIO

(doramectina a 1%)



## SOLUÇÃO INJETÁVEL

**Endectocida injetável à base de doramectina para uso em bovinos.**

**FÓRMULA:** Cada 100 mL contém:

Doramectina.....1,0 g  
Veículo.....q.s.p.....100,0 mL

**INDICAÇÕES:** Doracide é um endectocida indicado no tratamento, prevenção e controle de parasitas internos e externos dos Bovinos:  
Vermes gastrintestinais (adultos): *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformes*, *Cooperia pectinata*, *Haemonchus placei*, *Oesophagostomum radiatum*, *Cooperia punctata* e *Trichuris discolor*

Berries: larvas de *Dermatobia hominis*

Carrapatos: *Rhiphicephalus (Boophilus) microplus* (Adulto)

Miíases: prevenção das instalações das "bicheiras" causadas por larvas de *Cochliomyia hominivorax*

**Doracide pode ser administrado com segurança em bovinos jovens e adultos, inclusive bezerras e fêmeas prenhes.**

**MODO DE USAR E DOSAGEM:** Doracide deve ser administrado por via subcutânea nas doses recomendadas de preferência atrás ou na frente da "paleta".  
A dose recomendada é de 1 mL para 50 kg de peso, o que equivale a 0,2 mg / kg de peso.

### PERÍODO DE CARÊNCIA:

**ATENÇÃO: OBEDECER AO SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA:**

#### BOVINOS:

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 31 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIO PARA O CONSUMO.**

### CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO:

Não aplicar em animais doentes, debilitados, estressados ou exaustos.

Não aplicar em animais com hipersensibilidade conhecida ao princípio ativo do produto.

Não administrar em fêmeas produzindo leite para o consumo humano.

**Proibido o uso deste produto em bovinos de corte criados em regime de confinamento, semiconfinamento e em regime extensivo na fase de terminação.**

### PRECAUÇÕES:

- Doracide é um produto seguro, quando utilizado de acordo com as recomendações da bula.

- Manter a embalagem fechada e protegida da luz e do calor.

- Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto.

- Aplicar o produto somente pela via subcutânea, na pele solta a frente ou atrás da paleta.

- Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto.

- Não contamine coleções de água de qualquer natureza.

- Descartar as embalagens vazias e restos de produto, bem como lavar os equipamentos

usados de forma segura, evitando a contaminação do meio ambiente.

- Conserve a embalagem fora do alcance de crianças e animais domésticos.

- Não use a embalagem vazia.

- Não guarde ou aplique junto de alimentos, bebidas, produtos de higiene e domésticos.

**REAÇÕES ADVERSAS:** Na posologia indicada e sob orientação do Médico Veterinário não deve ocorrer intoxicação na espécie para o qual o produto é indicado.

**PRAZO DE VALIDADE:** 02 anos após a data de fabricação.

**Após a primeira perfuração da tampa, o produto pode ser utilizado por até 90 dias.**

**APRESENTAÇÃO:** Frasco plástico contendo 50 mL, 250 mL e 500 mL.

Conservar as embalagens fechadas, em local seco e fresco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº10.005/2015 em 03/09/2015. Resp. Técnico: Nelson Gonçalves de Oliveira - CRMV-SP nº 9010 S

### PROPRIETÁRIO E FABRICANTE

Bimeda Brasil S.A.  
Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, nº 421  
Monte Mor/SP – CEP 13190-000  
CNPJ 00.328.741/0001-04  
SAC 0800 555408  
www.bimeda.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA

 **Bimeda**<sup>®</sup>

8115203-A