

Terramicina® Pó Solúvel com Antigerm 77



USO VETERINÁRIO

Para o tratamento das infecções bacterianas de: Frangos de Corte, Poedeiras, Perus, Bovinos, Suínos, Coelhos, Ovinos e Caprinos.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 5 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE: NÃO CONSUMIR LEITE 5 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

OVINOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 5 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE: CONSUMIR LEITE 5 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

CAPRINOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 5 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE: NÃO CONSUMIR LEITE 5 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

SUÍNOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 5 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

AVES: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 5 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. OVOS: CONSUMIR OVOS 5 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

COELHOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 5 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

065106Z0

Terramicina® Pó Solúvel com Antigerm 77

USO VETERINÁRIO

Fórmula

Cada 100g contém:

Terramicina (cloridrato de oxitetraciclina)	5,5g
Antigerm 77 (cloreto de benzetonio)	5,5g
Veículo q.s.p.	100,0g

Indicações

Para o tratamento de diarreias (cursos), enterites, cólera aviária, tifo aviário, pulorose, doenças respiratórias (pneumonia, bronquites, coriza infecciosa) causadas por:

Escherichia coli, *Salmonella spp*, *Haemophilus gallinarum*, *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae* sensíveis a oxitetraciclina.

Dosagens e modo de uso

Pintos, peruzinhos, frangos, galinhas e perus - 1 medida (5g) para cada 5 litros de água durante 5 dias consecutivos.

Bovinos - 2 - 3 medidas (10 - 15g) para cada 60 kg de peso vivo, durante 5 dias consecutivos.

Suínos e coelhos - 2 - 3 medidas (10 - 15g) dissolvidas em água, durante 5 dias consecutivos.

Ovinos e caprinos - 1 - 2 medidas (5 - 10g) para cada 20 kg de peso vivo, durante 5 dias consecutivos.

Observações

1. O produto pode ser administrado, dissolvido na água de bebida, leite ou diretamente na boca do animal.
 2. As dosagens podem ser modificadas a critério do Médico Veterinário.
 3. Não interromper o tratamento antes de cinco dias, mesmo que antes disto haja desaparecimento dos sintomas.
 4. A água medicada deve ser fornecida em abundância para todos os animais em tratamento, durante 24 horas por dia. Nenhuma outra fonte de água, que não a medicada deve ficar disponível durante todo o período de tratamento.
 5. Preparar soluções novas de medicação diariamente, descartando as sobras anteriores.
 6. Caso o conteúdo não seja utilizado de uma só vez, feche bem a embalagem, para evitar entrada de umidade. Acompanha esta embalagem uma medida de 5 gramas.
- Armazenamento: Deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar. Manter fora do alcance de crianças.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.