

# PRIMER<sup>®</sup>

USO VETERINÁRIO

Contém 10  
dispositivos

**Dispositivo  
Intravaginal de  
Liberação Lenta  
de Progesterona**

# PRIMER®

USO VETERINÁRIO

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:  
O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS TRATADOS.  
O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS TRATADOS.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

**Descrição:**

Primer® é um dispositivo intravaginal impregnado com progesterona, utilizado para a regulação do ciclo estral em bovinos, programas de inseminação artificial, programas de superovulação de doadoras e sincronização de receptoras.

**Fórmula:**

Progesterona.....1 g  
Excipiente..... 24,2 g

**Apresentação:**

Bolsas contendo 10, 50 e 100 dispositivos.

**Ação:**

A progesterona liberada pelo dispositivo atinge níveis supraluteais (superiores a 1 ng/mL) poucas horas após sua colocação, exercendo um importante efeito sobre a dinâmica folicular e sobre o ciclo estral. Em associação com estrógenos a progesterona provoca regressão de folículo dominante e início de uma nova onda folicular. Após a retirada do dispositivo e a consequente queda dos níveis de progesterona, o bloqueio do eixo hipotálamo-hipofisário é liberado, permitindo o desenvolvimento final do folículo e a ovulação. Vários protocolos, associando a progesterona a outros hormônios, foram desenvolvidos com diversas finalidades, tais como: sincronização deaios, e ovulações para inseminação em tempo fixo, sincronização de receptoras, superovulação programada, tratamento de cistos ovarianos, tratamento de anestros entre outros.

**Indicações:**

Controle do ciclo estral em vacas e novilhas.

**Modo de uso:**

Com o uso do aplicador específico, inserir o dispositivo na vagina do animal, deixando a cauda plástica do produto para fora do vestibulo vulvar, para sua posterior remoção. A duração do tratamento deve ser de 7 a 9 dias.

**Precauções:**

Para a colocação no animal o operador deverá guardar as boas normas de higiene, conservando a limpeza do material e do animal. Recomenda-se lavar e desinfetar o aplicador logo após o uso. Armazenar em local seco, fresco, ao abrigo da luz solar direta, manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Evitar manipular o produto sem o uso de luvas. Não usar o produto por mais de nove dias consecutivos.

**Período de carência:**

Não há restrição para o consumo humano de leite e carne de animais tratados com Primer®.

**Efeitos colaterais:**

Não há efeitos colaterais associados à progesterona, quando utilizados na espécie e na posologia indicada em bula.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº SP 000292-5.000046 em 20/09/2005.

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho - CRF-SP nº 32.871

**Proprietário e Fabricante:**

**União Química Farmacêutica Nacional S/A.**  
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90 - Embu-Guaçu - SP - CEP: 06900-095  
DDG: 0800 701 1799  
CNPJ: 60.665.981/0001-18  
®Marca Registrada - Indústria Brasileira



7 896006 205890

4033099