

# EXCENEL® RTU EZ



## USO VETERINÁRIO

Suspensão estéril de cloridrato de ceftiofur

Para uso intramuscular em bovinos e suínos

### ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

#### BOVINOS:

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 3 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTA PRODUTO.**

**LEITE: NÃO HÁ NECESSIDADE DE PERÍODO DE RETIRADA PARA CONSUMO DE LEITE.**

#### SUÍNOS:

**ABATE: NÃO HÁ NECESSIDADE DE PERÍODO DE RETIRADA PARA O ABATE.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

Excenel® RTU EZ é uma formulação pronta para uso que contém sal cloridrato de ceftiofur, antibiótico cefalosporínico de amplo espectro, ativo contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, incluindo cepas produtoras de beta-lactamase. Como outras cefalosporinas, Ceftiofur é bactericida “in vitro”, interferindo na síntese da parede celular das bactérias susceptíveis.

#### Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Ceftiofur (na forma de cloridrato) . . . . . 5,0 g

Veículo q.s.p. . . . . 100,0 mL

#### Indicações:

##### Bovinos:

Os agentes etiológicos susceptíveis ao produto são: *Escherichia coli*, *Dichelobacter nodosus*, *Fusobacterium necrophorum*, *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella* Dublin e *Trueperella pyogenes*.

Agentes susceptíveis ao Excenel® RTU EZ	Enfermidade relacionada (bovinos)
<i>Escherichia coli</i>	Diarreia (Infecção entérica)
<i>Salmonella</i> Dublin	Diarreia (Infecção entérica)
<i>Dichelobacter nodosus</i>	Podridão dos cascos (Pododermatite)
<i>Fusobacterium necrophorum</i>	Podridão dos cascos (Pododermatite)
<i>Mannheimia haemolytica</i>	Pneumonia (Infecção respiratória)
<i>Pasteurella multocida</i>	Pneumonia (Infecção respiratória)
<i>Trueperella pyogenes</i>	Metrite (Infecção genitourinária)

#### Suínos:

Os agentes etiológicos susceptíveis ao produto são: *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Escherichia coli*, *Haemophilus parasuis*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella* Choleraesuis e *Streptococcus suis* tipo 2.

Agentes susceptíveis ao Excenel® RTU EZ	Enfermidade relacionada (suínos)
<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>	Pleuropneumonia
<i>Bordetella bronchiseptica</i>	Rinite atrófica
<i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>	Erisipela
<i>Escherichia coli</i>	Colibacilose / Infecção genitourinária
<i>Haemophilus parasuis</i>	Doença de Glasser
<i>Pasteurella multocida</i>	Pneumonia / Rinite atrófica
<i>Salmonella</i> Choleraesuis	Salmonelose
<i>Streptococcus suis</i> tipo 2	Meningoencefalite

#### Doses e modo de usar:

**Bovinos:** 1 mL / 50 kg

Administrar na dose de 1 mg de Ceftiofur / kg de peso, somente pela via intramuscular. Repetir o tratamento após intervalo de 24 horas por três dias consecutivos.

##### Suínos:

Administrar na dose de 1 a 3 mg de Ceftiofur / kg de peso, somente pela via intramuscular. Repetir o tratamento após intervalo de 24 horas por três dias consecutivos.

#### Agitar bem o frasco antes de usar.

Não havendo alteração do quadro clínico, consultar o Médico Veterinário para revisão do diagnóstico.

#### Contra-indicações:

O uso de Excenel® RTU EZ é contra-indicado para animais hipersensíveis à droga.

#### Advertências:

Penicilinas e cefalosporinas podem causar reações alérgicas em indivíduos sensíveis. Exposições tópicas a alguns antimicrobianos, inclusive ceftiofur, podem provocar reações alérgicas moderadas ou graves em alguns indivíduos. Exposições repetidas ou prolongadas podem induzir à sensibilização. Evitar contato direto do produto com a pele, olhos, boca e roupas.

Pessoas com hipersensibilidade conhecida à penicilina ou cefalosporinas devem evitar contato com o produto.

Em caso de acidentes oculares, lavar os olhos com bastante água por 15 minutos. Em acidentes tópicos, lavar a pele com água e sabão. Retirar a roupa contaminada. Se ocorrer reações alérgicas (erupção na pele, urticária, dificuldade respiratória), procurar cuidados médicos.

#### Precauções:

Áreas de descoloração associadas ao local da injeção no período inferior ou igual a 11 dias podem resultar em extirpação da região afetada no abate.

Armazenar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). Após aberto, utilizar todo o conteúdo em até 42 dias.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Licenciado pelo MAPA desde 09/12/1996, Registrado no SIPEAGRO sob o nº SP 000072-8.000017.

**Apresentação:** frasco-ampola de vidro contendo 100 mL.

**SAC: 0800 011 1919**

Responsável Técnico: Dr. Renato A. Beneduzzi Ferreira - CRMV-SP nº 1.695

**PRODUTO IMPORTADO**