

Blo-trol®

(marca do acetil-butileno)

USO VETERINÁRIO



ATENÇÃO - PERÍODO DE CARÊNCIA:

BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS: ABATE - CARÊNCIA ZERO.

LEITE - CARÊNCIA ZERO.

**PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PERÍODO DE CARÊNCIA,
CONSULTE A BULA DO PRODUTO.**

Conteúdo: 150 mL

zoetis

INDICAÇÕES:

Para o tratamento do timpanismo (empanzinamento) dos bovinos, ovinos e caprinos.

MODO DE USO E DOSAGENS:

Administrar o Blo-trol® por via oral, diluído em água ou por injeção direta no rúmen.

Se necessário, repetir a dose 6-10 horas após o primeiro tratamento.

BOVINOS20 a 30 mL

OVINOS E CAPRINOS 5 a 10 mL

As dosagens podem ser alteradas a critério do Médico Veterinário.

Blo-trol® é o ester tributílico do ácido 2-acetoxi 1-2-3 propano tricarbóxico em forma pura.

Armazenamento: Deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 000072-8.000001 em 12/11/59.

Responsável Técnico: Renato B. Ferreira
CRMV-SP nº 1.695