

# Fluatac DUO®

USO VETERINÁRIO

Controle estratégico de carrapatos, bernes,  
mosca-dos-chifres e nematódeos gastrintestinais  
Endectocida *pour on* para bovinos

## Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Fluazuron .....	3,00 g
Abamectina .....	0,50 g
Veículo q.s.p. ....	100,00 mL

## Indicações principais:

**Fluatac Duo** é indicado para auxiliar no controle estratégico de carrapatos *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, de mosca-dos-chifres (*Haematobia irritans*) e para auxiliar no controle de bernes (larvas de *Dermatobia hominis*). Também é indicado para o tratamento de bovinos infectados por nematódeos gastrintestinais (*Haemonchus placei*, *Cooperia punctata*, *Cooperia spatulata*, *Oesophagostomum radiatum*, *Trichostrongylus axei* e *Trichuris discolor*).

## Dosagens:

A aplicação do **Fluatac DUO** deve ser feita individualmente, com o

animal contido por corda, canzil, brete de tábuas estreitas ou cordoalha, devendo ser administrado pela via tópica (*pour on*), com aplicação em toda a linha dorsal dos bovinos, do meio do pescoço até a inserção da cauda, na dose de 5 mL para cada 50 kg, conforme tabela abaixo.

Peso (kg)	Volume de Fluatac DUO (mL)
51-100	10
101-150	15
151-200	20
201-250	25
251-300	30
301-350	35
351-400	40
401-450	45
451-500	50
501-550	55
551-600	60
601-650	65
Acima de 650	1 mL/10 kg

Geralmente o tratamento em dose única é suficiente para diminuir a infestação, porém as práticas de manejo existentes em cada propriedade como a rotação de pastagens, instalações, densidade animal, sexo, assim como características genéticas ou raciais, podem influenciar na incidência de parasitas e, conseqüentemente na eficácia do produto. Assim, cada propriedade rural poderá apresentar necessidades diferentes para o controle parasitário, sendo recomendado o controle integrado e estratégico de parasitas, a ser definido pelo médico-veterinário.

#### **Contraindicações:**

Não aplicar em bezerros com idade inferior a 16 semanas. Não aplicar em animais com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula do produto. Este produto não deve ser utilizado em vacas produtoras de leite para o consumo humano. De acordo com a Instrução Normativa nº 48/2011, o Fluatac Duo, assim como qualquer outra avermectina com período de carência maior que 28 dias, tem seu uso proibido em bovinos de corte criados em regime de confinamentos,

semiconfinamentos e em regime extensivo na fase de terminação. Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

#### **Precauções em animais:**

Evitar aplicar o produto em horas de calor intenso ou em dias chuvosos, pois essas condições não foram avaliadas. Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto. Somente o médico-veterinário está apto a fazer alterações nas dosagens do produto. Não foram realizados estudos de segurança com animais prenhes e/ou lactantes.

#### **Precauções em humanos:**

**Cuidado!** Irritante para os olhos, pele e mucosa. Evitar o contato com a pele, os olhos e a boca. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem completa do produto. **Perigo!** Causa danos se ingerido. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito, consulte um médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto. Em caso de inalação ou

aspiração, procure um local arejado, se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem completa do produto.

Durante a utilização do produto, proteger-se com roupas, luvas de borracha (luva nitrílica) e máscara adequadas. Não manusear o produto com as mãos desprotegidas.

Após a aplicação do produto, remover as luvas e lavar bem as mãos.

Não aplicar o produto em local próximo a chamas. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e/ou culturas agrícolas. Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos.

Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

Em caso de intoxicação acidental procure socorro médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

Não reutilizar as embalagens.

Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente. Não contaminar coleções de água de qualquer natureza.

A exposição direta à luz solar ou a altas temperaturas poderá degradar o produto.

#### **Reações adversas:**

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de hipersensibilidade individual podem ocorrer nos animais. Em caso de reação, procure imediatamente um médico-veterinário.

#### **ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA**

##### **BOVINOS**

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 60 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

## Intoxicação e superdosagem nos animais:

No caso de intoxicação por alta dosagem, os animais podem apresentar depressão motora geral, aumento da taxa respiratória, tremores musculares, midríase e rigidez extensa. Neste caso, procure um médico-veterinário e leve consigo a embalagem completa do produto.

## Interações medicamentosas:

Na literatura consultada não foi encontrada nenhuma interação medicamentosa com os princípios ativos.

## Informações para uso médico:

### Grupo químico:

Benzoilfenilureia/Avermectina;

### Ingrediente ativo:

Fluazuron/Abamectina;

**Ação tóxica:** Interfere na produção de quitina/ Estimula a liberação do ácido GABA, provocando paralisia;

**Antídoto/Tratamento:** Não há antídoto conhecido. Efetuar tratamento sintomático. Em caso de intoxicação acidental procure socorro médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

Conservar o produto na embalagem original, em local

seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Após aberto, consumir o produto em até 04 meses, mantendo-o em condições adequadas de armazenamento, conforme orientação de bula.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.557 em 18/03/2010.

## Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della  
Nina Pistoni  
CRMV/SP 24.508




Leia o QR code e  
acesse nosso  
Áudio Bula.

CUIDADO  VENENO

Proprietário e fabricante:  
Ourofino Saúde Animal Ltda.  
Rod. Anhanguera SP 330 km 298  
CEP: 14140 000 Cravinhos SP  
CNPJ: 57.624.462/0001-05  
www.ourofinosaudeanimal.com  
Indústria brasileira



 Atendimento  
16 3518 2025

 Whats SAC  
16 98181 8687  
(seg. a sex. das 8h às 17h)



500058917231 0160

 **ourofino**  
saúde animal