

CHEMITEC

Diuzon[®]

Solução Injetável

Uso Veterinário

Triclormetiazida + Dexametasona
Diurético e Anti-inflamatório para
Bovinos, Suínos, Caprinos e Ovinos.



FÓRMULA - Cada 100 mL contém:

Triclormetiazida	1,0 g
Dexametasona	0,05 g
Veículo q.s.p.	100,0 mL

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS E CAPRINOS: LEITE - O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM
ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO
HUMANO ATÉ 03 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS
INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE
RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O
ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

AÇÃO: A Triclormetiazida exerce seu efeito diurético nos túbulos renais, reduzindo a reabsorção Na⁺ e Cl⁻, aumentando deste modo a excreção de Cloreto de Sódio e água e diminuindo a excreção do Potássio e Bicarbonato. É através deste mecanismo de ação que a Triclormetiazida age reduzindo o acúmulo de líquidos em tecidos (edema). A Dexametasona é um análogo sintético da Prednisolona, porém com uma maior ação terapêutica anti-inflamatória e efeitos metabólicos diversos.

INDICAÇÕES: Diuzon[®] Solução Injetável é a combinação de uma marcada ação diurética da Triclormetiazida, com uma potente ação anti-inflamatória da Dexametasona. A combinação da Triclormetiazida com a Dexametasona reduz o edema fisiológico do parto, da glândula mamária das vacas leiteiras, porcas, cabras e ovelhas.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Bovinos, Suínos, Caprinos e Ovinos:

Aplicar de 10 a 20 mL, por via intramuscular, de acordo com a severidade do caso, podendo a dose ser repetida, conforme orientação do Médico Veterinário.

Normalmente a resposta ao tratamento é obtida de 24 a 48 horas após o início do mesmo. Caso a resposta não seja favorável em 3 dias, submeter o animal a uma nova avaliação clínica.

As alterações na posologia e modo de usar poderão ser efetuadas conforme orientação do Médico Veterinário.

RECOMENDAÇÕES:

- É recomendável que o Médico Veterinário associe uma terapia antibacteriana, caso ocorra ou seja preexistente uma infecção bacteriana associada ao edema.
- Deve-se respeitar as recomendações gerais para o uso de produtos por via intramuscular como as de assépsia do material e desinfecção local.

CONTRAINDICAÇÕES E EFEITOS COLATERAIS:

- O uso inadequado e dosagens altas de triclormetiazida por um período longo de tempo podem produzir depleção eletrolítica.
- Não aplicar em animais com séria disfunção renal.
- Não aplicar nas infecções por vírus, no estágio vírêmico.
- Não aplicar em cabras e ovelhas prenhes.
- Não usar no último trimestre da gestação. Os corticosteroides podem provocar o aparecimento de sinais de parto se aplicados no último trimestre da gestação ou anteciparem o parto se aplicados durante os últimos 30 dias da gestação.

APRESENTAÇÃO:

Frascos-ampola de vidro transparente contendo 10 e 50 mL.
Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.
Licenciado no M. A. sob o nº 8.655 em 21/07/2003.

VENCIMENTO: 2 (dois) anos após a data da fabricação.



Proprietário: **CHEMITEC AGRO-VETERINÁRIA LTDA.**
Av. Pres. Wilson, 3458 - São Paulo/SP - Tel.: (11) 2274-7022
CNPJ: 01.299.649/0001-18 - Ind. Brasileira
©Marca Registrada - www.chemitec.com.br
Resp. Técnico: Carlos H. A. Baptista - CRF/SP 30.191
Fabricantes: Vetecia Lab. de Produtos Veterinários Ltda.
R. Dr. Alfredo Ramos, nº 236 - Jacareí/SP
CNPJ: 07.685.131/0001-07
RhoBifarma Ind. Farmacêutica Ltda.
Rua Calêndulas, 250 - Hortolândia/SP
CNPJ: 04.913.008/0001-08

0027-03
35A
85x130
XII/2020