

Mata-bicheiras

Uso Veterinário
Spray

AGITE ANTES DE USAR

PRATA

Total



Aerocid

Larvicida
Bernicida
Cicatrizante
Repelente
Antisséptico

ATENÇÃO - OBTENHA AOS SEQUENTES PERÍODOS DE CARÊNCIA BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS - ABATE: 3 DIAS. LEITE: 2 DIAS

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE RÓTULO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL INAPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

PESO LÍQUIDO/VOLUME LÍQUIDO
123,8 g/200 mL

AGENER
UNIÃO
SAÚDE ANIMAL

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:	
Clorfenirvina	1,6 g
Cipermetrina	0,4 g
Sulfadiazina de prata	0,1 g
Veículo q.s.p.	100,0 mL
Propelente: gás butano	

INDICAÇÕES:

- Produto é indicado para bovinos, ovinos e caprinos no tratamento curativo e preventivo de:
 - Ferimentos de origem traumática ou cirúrgica (descorna, castração, marcações etc.).
 - Afecções do umbigo dos recém-nascidos.
 - Infestações por larvas de insetos (barnes e bicheiras).
 - Ectoparasitas sensíveis aos princípios ativos da formulação.
 - Frieiras e rachaduras dos cascos.
- Ação adstringente e antisséptica do produto auxilia e favorece no processo de cicatrização dos ferimentos.

POSOLOGIA E MODO DE USAR:

O produto é de uso exclusivamente externo para ser aplicado sobre as lesões na pele do animal. Não administre este produto por outra via que não seja a indicada.

AGITE BEM O FRASCO ANTES DE USAR

- Limpe o máximo possível o ferimento com um produto antisséptico.
- Use uma luva impermeável para aplicar o produto.
- Agite energicamente o frasco por cerca de 15 segundos.
- Posicione a válvula aplicadora na direção da região a ser tratada, afastando a embalagem cerca de 15 cm do animal.
- Pressione a válvula e aplique uma camada uniforme do produto sobre o local. A cor característica do produto indica o local onde foi aplicado.
- Deixe secar espontaneamente ao ar livre, garantindo que o produto não seja removido.
- Repita o tratamento a cada 24 horas até a cura completa da lesão.
- O tratamento preventivo usualmente é feito em dose única. O tratamento curativo deve ser feito diariamente até a cicatrização do ferimento.
- No caso de agravamento ou ausência de melhora das lesões após 2 ou 3 dias de tratamento, recomenda-se a avaliação do Médico Veterinário.

CONTRAINDICAÇÕES:

- O produto deve ser aplicado em uma área menor que um quarto da superfície corpórea do animal.

PRECAUÇÕES:

- Siga todas as boas práticas de administração de produtos contendo inseticidas.
- Use equipamento de proteção individual na aplicação.
- Aplique o produto sempre a favor do vento.
- Não permita que o produto entre em contato com as suas roupas e pele. Se isso ocorrer, remova as roupas afetadas e lave a pele atingida pelo produto.
- Não fume, coma ou beba durante a aplicação.
- Não aplique o produto (puro ou diluído) sobre a água, alimentos ou rações.
- Utilize o produto exatamente conforme as instruções contidas no rótulo. Não lance o produto nos rios, cursos de água, redes de esgoto e águas pluviais.
- Não periture nem reutilize as embalagens.

NO CASO DE INTOXICAÇÃO, procure o médico imediatamente. O produto é um cicatrizante e repelente veterinário à base de clorfenirvina, cipermetrina e sulfadiazina de prata. Todos os envenenamentos por organofosforados devem ser considerados casos de emergência e o paciente deve ser enviado ao hospital o mais rapidamente possível. Tratamento das intoxicações:
Clorfenirvina: administração de sulfato de atropina, oximas e diazepam.
Cipermetrina: sintomático.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

Recomenda-se que os animais cuja carne seja destinada ao consumo humano sejam abatidos 3 dias após a última administração do produto.
Recomenda-se não utilizar para consumo humano o leite das vacas produzido no período de 2 dias após a última administração do produto.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15 a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Manter o produto afastado do fogo.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO


Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 8.711 em 18/09/2003.

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho
CRF-SP nº 32.871

**ATENÇÃO: PRODUTO INFLAMÁVEL
NÃO DIRIJA JATOS DO PRODUTO PARA CHAMAS, NEM JOGUE
AS EMBALAGENS NO FOGO OU INCINERADOR**



**A FISPQ deste
produto poderá
ser obtida junto
ao DDG.**



PROPRIETÁRIO:
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90
Embu-Guaçu - SP - CEP: 06900-000
DDG: 0800 701 1799 - CNPJ: 60.665.981/0001-18
Indústria Brasileira

FABRICANTE:

Ipanema Ind. de Prod. Veterinários Ltda.
Rod. Raposo Tavares, Km 113
Barreiro/Araçoiaba da Serra - SP - CEP: 18190-000
Inscr. Est.: 178.005.260.113
CNPJ: 64.687.015/0001-52 - Indústria Brasileira



4036897 - 167 x 120 mm