

Clamoxyl®

USO VETERINÁRIO

Injetável

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 25 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

LEITE: O LEITE DE VACAS EM TRATAMENTO E NAS 96 HORAS SEGUINTE AO TRATAMENTO, NÃO DEVE SER USADO PARA CONSUMO HUMANO.

OVINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 25 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DE OVINOS EM TRATAMENTO E NAS 96 HORAS SEGUINTE AO TRATAMENTO, NÃO DEVE SER USADO PARA CONSUMO HUMANO.

CAPRINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 25 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DE CAPRINOS EM TRATAMENTO E NAS 96 HORAS SEGUINTE AO TRATAMENTO, NÃO DEVE SER USADO PARA CONSUMO HUMANO.

SUÍNOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 25 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Fórmula: Cada 100 mL contém:

Amoxicilina (trihidratada) 15,0 g

Veículo q.s.p. 100,0 mL

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

- Clinicamente efetivo por 48 horas.
- Mata as bactérias rapidamente. Aumenta as possibilidades de uma cura mais rápida e segura.
- Ampla espectro de atividade: Efetivo contra a maioria das bactérias responsáveis pelas principais infecções dos animais domésticos.
- Excelente absorção local: Altos níveis de Clamoxyl® nos tecidos garantem maiores chances de uma recuperação mais rápida.

Descrição:

Clamoxyl® é uma solução de amoxicilina em um veículo oleoso que proporciona resultados terapêuticos mais seguros e práticos e com menor número de injeções por tratamento. Uma única injeção acarreta níveis sanguíneos bactericidas efetivos por 48 horas, uma vez que a amoxicilina é liberada lentamente na circulação sanguínea. A amoxicilina, que é o princípio ativo do produto é uma penicilina semi-sintética, de amplo espectro, bactericida “in vivo” e “in vitro”, contra a grande maioria das bactérias Gram positivas e Gram negativas responsáveis pelas principais infecções dos animais domésticos.

Experimentos realizados a nível de campo demonstram que, a amoxicilina mata as bactérias com maior rapidez que outros antibióticos usualmente empregados na terapêutica veterinária. Isto é muito importante, sobretudo quando se trata de animais mais suscetíveis a estresse ou, mesmo, já estressados.

INDICAÇÕES:

Controle ou tratamento de infecções por microrganismos sensíveis a amoxicilina em bovinos, ovinos, caprinos, suínos, cães e gatos.

Clamoxyl® é também recomendado no controle de infecções secundárias nos casos em que o microrganismo sensível não seja a causa primária da doença. Pode também ser utilizado como preventivo de infecções nas castrações, no pré e pós-operatório de qualquer outra intervenção cirúrgica, a critério do Médico Veterinário. Clamoxyl® é particularmente indicada em:

Bovinos: Actinobacilose (*Actinobacillus lignieresii*), Actinomicose (*Actinomyces bovis*), Artrite infecciosa (*E. coli*, *Salmonella sp*), Carbúnculo hemático (*Bacillus anthracis*), Carbúnculo sintomático (*Clostridium sp*), Cistite e metrite (*E. coli*, *Corynebacterium spp*, *Staphylococcus sp*), Diarréia (*E. coli*, *Salmonella sp*), Infecção do casco (*Actinomyces sp*), Onfalte e Onfaloflebite (*Streptococcus sp* e *Staphylococcus sp*), Pasteurelose (*Pasteurella spp*), Pneumonias (*Pasteurella spp*, *Actinobacillus [Haemophilus] spp*, *Bordetella sp*, *Streptococcus spp*) e Queratoconjuntivite (*Moraxella bovis*).

Clamoxyl® pode ser usado como medicação de apoio na terapêutica da mastite bovina, associada ao tratamento tópico com medicação específica.

Ovinos e caprinos: Actinobacilose (*Actinobacillus lignieresii*), Artrite infecciosa (*E. coli*, *Salmonella sp*), Carbúnculo hemático (*Bacillus anthracis*), Carbúnculo sintomático (*Clostridium sp*), Diarréia (*E. coli*, *Salmonella sp*), Infecção do casco (*Actinomyces sp*) e metrite (*E. coli*, *Corynebacterium spp*, *Staphylococcus sp*, *Streptococcus sp*).

Suínos: Diarréia (*E. coli*, *Salmonella spp*), Erisipela (*Erysipelothrix rhusiopathiae*), Metrites (*E. coli*, *Staphylococcus sp*, *Streptococcus sp*), Onfalte e Onfaloflebite (*Streptococcus sp*, *Staphylococcus sp*), Pneumonia (*Pasteurella spp*, *Actinobacillus [Haemophilus] spp*, *Bordetella bronchiseptica*) e Septicemia hemorrágica (*Actinobacillus spp*, *Pasteurella spp*).

Cães e gatos: Gasterenterite hemorrágica (*E. coli*, *Salmonella spp*), Infecções da pele (*Staphylococcus spp*), Metrites (*Streptococcus sp*, *Staphylococcus sp*, *E. coli*), Nefrites e Infecções urinárias (*E. coli*), Onfalte e Onfaloflebite (*Streptococcus sp*, *Staphylococcus sp*), Otite (*Streptococcus spp*), Pneumonia (*Pasteurella spp*, *Actinobacillus [Haemophilus] spp*).

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO, MODO DE USAR E DOSES

Vias de administração:

Clamoxyl® deve ser administrado por via subcutânea ou intramuscular.

Modo de Usar:

- Agitar energicamente o frasco antes do uso.
- Após a injeção, massagear o local para facilitar a dispersão do produto.

OBSERVAÇÕES:

- Em cães e gatos, não utilizar agulhas de calibre menor que 8.
- Quando a dose for superior a 20 mL, recomenda-se dividir-la em dois locais diferentes.
- Não se recomenda a administração de Clamoxyl® por via intravenosa ou intra-sinovial.
- À semelhança de outros fármacos à base de penicilina, Clamoxyl® é sensível à hidrólise, quando em contato com a água. Por essa razão, no momento do uso, recomenda-se utilizar agulhas e seringas secas quando se fizer a transferência do produto do frasco para a seringa.

Doses:

A dosagem recomendada é de 15 mg/kg de peso vivo, ou seja, 1 mL da suspensão para 10 kg/peso.

Após 48 horas da primeira dose, fazer uma outra aplicação. A dose e a posologia podem ser alteradas à critério do Médico Veterinário.

CONTRA-INDICAÇÕES:

- O produto é exclusivamente para uso veterinário.
- A semelhança de outras penicilinas, a amoxicilina não deve ser utilizada oral ou parenteralmente em coelhos, cobaias e hamsters.
- O uso desse produto eventualmente poderá provocar reação no local da aplicação.
- Não usar o produto em animais com histórico de hipersensibilidade às penicilinas. Em caso de reações alérgicas, medicar com epinefrina e/ou corticoides.

PRECAUÇÕES FARMACÊUTICAS:

- Manter o produto fora do alcance de crianças e de animais domésticos.
- Deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar.
- Após abrir o frasco, usar todo o conteúdo dentro do prazo de 28 dias.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Algumas características do Clamoxyl® merecem ser destacadas:

1. Após a aplicação, a amoxicilina é rapidamente absorvida e distribuída por todos os tecidos, atingindo altas concentrações do antibiótico sobretodo nos rins, fígado e bile.
2. Nas infecções respiratórias, a amoxicilina ultrapassa as membranas pulmonares inflamadas, atuando também, na presença de muco. Quando cede a infecção e o processo inflamatório, quantidades efetivas de amoxicilina mantêm-se no muco, impedindo que a infecção reapareça.
3. A ação bactericida rápida é de grande importância na eliminação da bactéria (Ex.: A *E. coli* é completamente destruída por 10 µg/mL de amoxicilina em apenas 1 hora “in vitro”).

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

PRODUTO IMPORTADO