

EQUEST®

Moxidectina 2% Gel para uso oral em eqüinos

USO VETERINÁRIO

Antiparasitário para uso no tratamento e controle de parasitas internos e externos de equinos.

FÓRMULA: Cada 100 g contém:

Moxidectina 2,0 g
Excipiente q.s.p. 100,0 g

ATENÇÃO: OBEDECER OS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

EQUINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 28 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO.

INDICAÇÕES: EQUEST® é um antiparasitário de amplo espectro altamente efetivo contra estágios imaturos e adultos dos principais parasitas gastrintestinais e ectoparasitas de cavalos e outros eqüídeos.

- **Grandes Estrôngilos:** *Strongylus vulgaris* (adultos e estágio arterial), *Strongylus edentatus* (adultos e estágio peritoneal), *Strongylus equinus* (adultos)**, *Triodontophorus* spp. (adultos)**.
- **Pequenos Estrôngilos:** *Cyathostominae*: adultos e estágios larvais, incluindo fases encistadas, das seguintes espécies: *Cyathostomum* spp., *Cylicocylus* spp., *Posteristomum* spp., *Cylicodontophorus* spp., *Cylicostephanus* spp., *Gyalocephalus* spp.
- **Outros parasitas internos:** *Dictyocaulus arnfieldi*, *Oxyuris equi* (adultos e estágios larvares), *Parascaris equorum* (adultos e estágios larvares), *Trichostrongylus axei* (adultos)**, *Strongyloides westeri* (adultos)**, *Habronema muscae* (adultos e estágios larvares), *Habronema majus* (adultos)**.
- **Larvas de Estômago:** *Gasterophylus intestinalis* (larvas de 2° e 3° estágio), *Gasterophylus nasalis* (larvas de 2° e 3° estágios).

• **Filárias:** *Onchocerca cervicalis* (microfilária).

• **Ferida de verão (Habronemose cutânea):** estágios cutâneos de nematóides da família *Spiruridae* (como *Habronema muscae* e *Habronema majus*).

• **Carrapatos:** *Amblyomma cajennense*, *Dermacentor (Anocentor) nitens*.

** Dados insuficientes referentes a estágios larvares nos estudos realizado até o momento.

DURAÇÃO DO EFEITO: Em ensaios críticos comparativos, EQUEST® demonstrou excelente controle de parasitas gastrintestinais (avaliado pela recorrência de ovos em amostras fecais), até 16 semanas após o tratamento.

MODO DE USAR E DOSAGEM: EQUEST® é embalado em uma seringa pronta-para-uso, calibrada de acordo com o peso do cavalo, de forma a fornecer a dose recomendada de 0,4 mg de moxidectina/kg de peso corporal. Para usar a seringa de EQUEST®, gire o anel de graduação, ajustando-o ao peso do cavalo a ser tratado (com aproximação de 25 kg). Verifique se não há alimento na boca, remova a capa da seringa e introduza-a oralmente, através do espaço interdental. Com o bico da seringa próximo à base de língua, pressione o êmbolo até alcançar a válvula. Remova a seringa e levante a cabeça do animal para assegurar a ingestão adequada do gel. Recoloque a capa da seringa. O conteúdo restante deve ser armazenado de acordo com as instruções do rótulo.

NOTA: EQUEST® é evanescente uma vez na boca, dificultando, assim, ser cuspidado pelo cavalo.

Cada seringa pode conter EQUEST® suficiente para tratar mais de um animal, quando administrado em potros, animais em crescimento ou raças mais leves. Para evitar sub ou sobredosagem, a dose administrada deve ser baseada no peso do animal. Use uma balança ou fita torácica para melhor determinação do peso do cavalo a ser tratado.

A tabela a seguir pode ser usada como guia geral para dosagem:

Idade	Pôneis		Raça de cavalos leves		Raça de cavalos pesados	
	Peso (Kg)	Doses por seringa	Peso (Kg)	Doses por seringa	Peso (Kg)	Doses por seringa
3 meses	60	9	125	4	155-170	3
6 meses	95	6	185	3	230-265	2
Adulto	200	2	400	1	500 ou mais	1

RECOMENDAÇÕES: Procure seu Médico Veterinário para assistência no diagnóstico, tratamento e controle dos parasitas. Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM: Conservar em local seco e fresco (entre 15°C e 30°C), ao abrigo da luz solar.

SEGURANÇA: EQUEST® apresenta grande margem de segurança, não afetando éguas de reprodução, garanhões, potros e cavalos em treinamento ou trabalho.

PROGRAMA DE CONTROLE DE PARASITAS: Para melhor controle de parasitas, todos os cavalos e pôneis devem ser incluídos em um programa de tratamento estratégico, com cuidado especial dado à animais de alta performance, éguas de reprodução e potros.

Em potros, o tratamento inicial é recomendado aos 2-3 meses de idade, depois do qual eles devem ser incluídos em um programa de rotina de retratamento. Por promover especial e único controle de pequenos estrôngilos encistados (*Cyathostominae*), ele pode ser particularmente útil na redução de frequência de dosificação em programas de tratamento estratégicos.

Consulte o seu veterinário para auxiliar na preparação do programa que mais se adequa às suas necessidades.

CUIDADOS E RESTRIÇÕES DE USO:

- Não usar em outras espécies, para as quais a segurança dessa formulação não está determinada.
- Evite fumar ou comer durante o manuseio. Lave bem as mãos após o mesmo.
- EQUEST®, assim como todos os outros medicamentos, deve ser mantido longe do alcance de crianças.

PRODUTO IMPORTADO

TELEFONE DE EMERGÊNCIA PARA USO MÉDICO: 0800 014 8110