

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEQUENTES PERÍODOS DE CARENÇA
BOVINOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 63 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTES PRODUTOS.
LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS DE BOVINOS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPROPRIO PARA O CONSUMO.

Proibido o uso deste produto em bovinos de corte criados em regime de confinamento, semi-confinamento e em regime extensivo na fase de terminação.

USO VETERINÁRIO

Características do Produto:

Treo ACE® é um endectocida (vermífugo e ectoparasiticida) de alta concentração, alta eficácia e amplo espectro de ação. A formulação com tecnologia Zoetis proporciona um período de proteção prolongado contra parasitos internos e externos dos bovinos.

Um tratamento com Treo ACE® controla, ao mesmo tempo, uma ampla variedade de vermes redondos gastrintestinais e pulmonares e ectoparasitos que comprometem a saúde e a produtividade dos bovinos. Treo ACE® possui ampla margem de segurança, é bem tolerado e fácil de aplicar.

Descrição do Produto:

Treo ACE® contém doramectina, princípio ativo derivado da fermentação de uma cepa geneticamente alterada de *Streptomyces avermitilis*.

Treo ACE® é uma solução injetável, estéril, pronta para uso, contendo 3,5% de doramectina. É formulado para proporcionar a dosagem recomendada de 700 mcg/kg, quando aplicado pelas vias intramuscular ou subcutânea na dose de 1 mL/50 kg de peso corporal.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Doramectina.....3,5g

Veículo.....q.s.p.....100,00 mL

Indicações:

Treo ACE® é indicado para o tratamento e controle das parasitoses bovinas causadas por nematódeos (vermes) gastrintestinais e pulmonares, miases (bicheiras), bernes, piolhos, ácaros da sarna e como auxiliar no controle de carrapatos e da população da mosca-dos-chifres, conforme as especificações a seguir:



Nematódeos gastrintestinais (adultos e larvas de quarto estágio):

Bunostomum phlebotomum

Cooperia pectinata

Cooperia punctata

Haemonchus placei

Haemonchus similis

Ostertagia ostertagi

Oesophagostomum radiatum

Trichostrongylus axei

Trichostrongylus colubriformis

Trichostrongylus longispicularis



Nematódeos pulmonares

(adultos e larvas de quarto estágio):

Dictyocaulus viviparus



Miases (bicheiras):

Cochliomyia hominivorax

Treo ACE® também pode ser utilizado como auxiliar no controle de:



Piolhos:

Haematopinus eury sternus

Linognathus vituli

Solenopotes capillatus



Carrapatos:

Rhipicephalus (Boophilus) microplus



Ácaros da sarna:

Psoroptes bovis



Bernes:

Dermatobia hominis



Mosca-dos-chifres

Haematobia irritans

Piolho mastigador:

Damalinea bovis

Esquemas de tratamento

Recomenda-se o uso de Treo ACE® nas seguintes categorias animais:

Bovinos de Corte:

Bezerros(as) recém-nascidos(as) para prevenção e tratamento da bicheira de umbigo (miíase).

Bezerros(as) ao desmame para tratamento e controle de verminoses e ectoparasitos.

Garrotes no momento da castração para a prevenção e tratamento da bicheira (miíase).

Bois em fase de engorda, Novilhas, Garrotes, Vacas e Touros para tratamento e controle de verminoses e ectoparasitos.

Bovinos de Leite:

Bezerros(as) recém-nascidos(as) para prevenção e tratamento da bicheira de umbigo (miíase).
 Bezerros(as), Novilhas, Garrotes e Touros para tratamento e controle de verminoses e ectoparasitos.

Treo ACE® deve ser utilizado como parte de um programa de controle de parasitos que pode variar em função das práticas de manejo da propriedade, localização geográfica, clima, prevalência e dinâmica parasitária.

Consulte sempre um Médico Veterinário para assistência no diagnóstico, tratamento e elaboração de um programa adequado de controle dos parasitos.


Dosagem e modo de usar:

Aplicar Treo ACE® pela via subcutânea ou intramuscular na dose de 1 mL para cada 50 kg de peso corporal (700 mcg de doramectina por kg de peso).

Utilize a tabela abaixo como referência:

Peso (kg)	Dose (mL)	Peso (kg)	Dose (mL)
Até 50 kg	1	301 – 350	7
51 – 100	2	351 – 400	8
101 – 150	3	401 – 450	9
151 – 200	4	451 – 500	10
201 – 250	5	501 – 550	11
251 – 300	6	551 – 600	12

Administrar o produto via subcutânea nas áreas de pele solta do pescoço, na frente ou atrás da paleta ou intramuscular no músculo do pescoço (ver desenho ao lado).



Precauções:

Seguir os procedimentos padrão de antisepsia e assepsia antes de administrar o produto.

Em áreas de alta incidência de infecções por *Clostridium*, recomenda-se manter os animais vacinados segundo o programa recomendado pelo Médico Veterinário.

Evite fumar, comer ou beber durante a administração do produto.

Lave as mãos após o manuseio do produto.

Segurança:

Treo ACE® possui ampla margem de segurança, inclusive em bezerros recém-nascidos.

Não foram observadas reações adversas mesmo quando o produto foi aplicado em doses superiores à recomendada.

Segurança ambiental:

A doramectina entra em contato com o solo, liga-se rapidamente e firmemente à matéria orgânica e partículas do solo, tornando-se inativa.

Evite a contaminação de mananciais de água como rios, lagos e represas. Todos os equipamentos usados para aplicação do produto devem ser limpos de maneira a evitar contaminação ambiental. É recomendado que as embalagens sejam descartadas em aterro industrial ou encaminhadas para incineração.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Conservar o produto em local seco, fresco em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e ao abrigo da luz solar.

Manter o produto fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

Após aberto, consumir todo o conteúdo do frasco em até 90 dias.