



RIC-BE

Uso Veterinário

ATENÇÃO – OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS: ABATE – O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS TRATADOS
LEITE – O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS TRATADOS

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Benzoato de Estradiol 100 mg
Veículo q.s.p..... 100 mL

Generalidades:

O Benzoato de Estradiol é um derivado sintético do 17 β -estradiol, hormônio esteróide sintetizado pelo folículo ovariano, desenvolvido para otimizar os resultados reprodutivos dos tratamentos com progestágenos em bovinos.

O uso do Benzoato de Estradiol no momento da aplicação do progestágeno (considerado como o dia 0) provoca uma nova onda folicular e sua aplicação quando da retirada do implante progestágeno induz um pico pré-ovulatório de LH através do "feed-back" positivo do estradiol sobre o GnRH e LH, o que resulta em uma alta sincronização de ovulações.

Indicações:

Em vacas de corte e de leite como:

- Auxiliar na indução e sincronização de cio com progestágenos.

Posologia:

Administrar em vacas de corte e de leite, unicamente por via intramuscular. O produto é administrado antes da aplicação do progestágeno e/ou depois, de acordo com o protocolo utilizado. Em termos gerais as doses utilizadas são:

Indicação	Dose de RIC-BE (mL) antes do progestágeno	Dose de RIC-BE (mL) depois do progestágeno
Sincronização do cio	2	1

O intervalo entre as doses depende do protocolo utilizado, ficando a critério do Médico Veterinário. Em termos gerais, esquemas que utilizam progestágenos, o intervalo entre as doses é de 5 a 9 dias, quando o protocolo inclui 2 doses de RIC-BE.

Contraindicações:

Não há contraindicações quando utilizado de acordo com a posologia recomendada.

Efeitos colaterais e secundários:

Não foram observados.



**Precauções:**

Uma vez retirada a primeira dose, recomenda-se consumir todo o produto no mesmo dia ou desprezar as doses restantes.

Período de carência:

Não há período de carência para carne e leite.

Apresentação:

Frasco ampola de vidro contendo 50 e 100 mL.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.448 em 22/01/2009.

Responsável Técnico:

Vânia N. A. de Carvalho - CRF-SP nº 32.871

Conservar em lugar fresco (entre 10 e 30 °C) ao abrigo da luz e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Prazo de validade: 2 (dois) anos após a data da fabricação.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO**Proprietário e Fabricante:**

União Química Farmacêutica Nacional S/A.
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90
Embu-Guaçu – São Paulo – CEP: 06900-000
DDG: 0800 701 1799
CNPJ: 60.665.981/0001-18
© Marca Registrada – Indústria Brasileira



4007220 - 100 x 150 mm - Laetus 416