

# Ripercol® L - 150F

Anti-helmíntico e imunostimulante inespecífico para bovinos à base de fosfato de levamisol 18,8%

## USO VETERINÁRIO

### ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

#### BOVINOS:

**ABATE:** O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 7 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

**LEITE:** O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 2 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

**Fórmula:** Cada 100 mL contém:

Fosfato de Levamisol ..... 18,8 g

Veículo q.s.p. .... 100 mL

**Injetável por via subcutânea.**

**Ripercol® L - 150F** destina-se ao tratamento das verminoses gastrintestinais e pulmonares de bovinos.

#### Indicações:

**Ripercol® L - 150F** controla todos os helmintos de importância econômica na criação de bovinos: *Haemonchus* spp., *Cooperia* spp., *Ostertagia* spp., *Trichostrongylus* spp., *Nematodirus* spp., *Bunostomum phlebotomum*, *Neoscaris vitulorum*, *Oesophagostomum radiatum*, *Chabertia* spp. e *Dicytycaulus viviparus* (verme do pulmão).

**Ripercol® L - 150F**, quando aplicado após as vacinações rotineiras, tem efeito imunostimulante inespecífico.

#### Modo de Usar:

**Ripercol® L - 150F** deve ser aplicado em injeções subcutâneas, de preferência na região posterior ou anterior à escápula (pá). Não se deve aplicar este ou qualquer outro produto injetável sobre a pá ou costelas dos bovinos. Em condições climáticas ou de manejo que favoreçam as infestações, a critério do médico veterinário, pode-se repetir o tratamento 3 a 4 semanas após a primeira aplicação.

#### Administração:

Agulhas e seringas, antes do uso, devem ser submetidas aos processos de esterilização normais. O local de injeção, no animal, deve ser previamente desinfetado com algodão embebido em álcool iodado ou semelhante. Recomenda-se subdividir a dose em locais diferentes, no caso de volumes superiores a 10 mL.

#### Doses:

Aplicar 1 mL de **Ripercol® L - 150F** para cada 40 kg de peso corporal. Nos casos de infestações altas por *Trichostrongylus axei* e *Ostertagia* spp., recomenda-se dobrar a dose, ou seja, 2 mL para cada 40 kg de peso corporal.

Para orientação, veja a tabela abaixo:

Peso do bovino	Dose de Ripercol® L - 150F
41 a 80 kg	2 mL
81 a 120 kg	3 mL
121 a 160 kg	4 mL
161 a 200 kg	5 mL
201 a 240 kg	6 mL
241 kg em diante	1 mL para cada 40 kg de peso vivo



**LOCAL CORRETO DE APLICAÇÃO**

Doses superiores a 10 mL devem ser subdivididas e aplicadas em locais diferentes.

#### Cuidados:

- Não submeter os animais a exercícios prolongados antes ou depois do tratamento.
- Seringas e agulhas devem ser esterilizadas antes do uso.
- O local de aplicação deve ser desinfetado com álcool iodado ou produto similar.
- Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.
- Produtos injetáveis podem ocasionar raros casos de reações de hipersensibilidade individual. O grau dessas reações depende da sensibilidade de cada animal tratado.
- Em animais jovens, evitar sobredose e naqueles debilitados por problemas infecciosos e/ou nutricionais, recomenda-se o tratamento destes problemas antes da aplicação de qualquer antiparasitário.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**Armazenamento:** Deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar.