

Terramicina® /LA Solução Injetável

USO VETERINÁRIO

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 28 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS EM TRATAMENTO E NAS 120 HORAS SEGUINTE AO TRATAMENTO, NÃO DEVE SER USADO PARA CONSUMO HUMANO.

SUÍNOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 28 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

A Terramicina®/LA Solução Injetável é um produto estável, à base de oxitetraciclina dihidratada - antibiótico de amplo espectro, altamente ativo contra um grande número de microrganismos Gram-positivos e Gram-negativos, certas espécies de micoplasmas, riquetsias e protozoários.

A Terramicina®/LA Solução Injetável apresenta uma formulação contendo 200 mg de Oxitetraciclina dihidratada por mL. É rapidamente absorvida, mantendo um alto nível na corrente sanguínea por um período de 3 a 5 dias. É absolutamente estéril, não necessita de refrigeração e está pronta para uso.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Oxitetraciclina (di-hidratada) 20,0 g
Veículo q.s.p.100,0 mL

INDICAÇÕES:

BOVINOS: Para o tratamento de anaplasmose (*Anaplasma marginale*), pneumonia (*Pasteurella multocida*, *Haemophilus sp*, *Mycoplasma sp*, *Bordetella sp*, *Klebsiella sp*), leptospirose (*Leptospira sp*), podridão do casco (foot-root), difteria, metrite, mastite sistêmica (*Pasteurella sp*, *Bacillus sp*, *Streptococcus sp*, *Klebsiella sp*, *Mycoplasma sp*), enterite bacteriana (*E. coli*, *Salmonella sp*), actinobacilose (*Actinobacillus sp*), artrite infecciosa (*E. coli*, *Salmonella sp*), feridas infecciosas, pericardite infecciosa, dermatofilose (*Dermatophilus congolensis*) e queratoconjuntivite infecciosa (*Moraxella bovis*).

Auxiliar no controle e prevenção das infecções pós-operatórias e pós-parto causadas por germes sensíveis à oxitetraciclina.

SUÍNOS: Para o tratamento da pneumonia (*Pasteurella sp*, *Haemophilus sp*, *Mycoplasma sp*, *Bordetella bronchiseptica*), leptospirose (*Leptospira sp*), erisipela (*Erysipelotrix sp*), enterite bacteriana, artrite infecciosa e feridas infecciosas (*E. coli*, *Salmonella sp*).

Auxiliar no controle e prevenção da síndrome MMA (metrite-mastite-agalaxia) causadas por *E. coli* e *Klebsiella sp* em porcas, diarreia em leitões, e infecções pós-operatórias e pós-parto causadas por *E. coli* e *Salmonella sp*.

MODO DE USAR E DOSAGEM:

A Terramicina®/LA Solução Injetável é indicada pela via subcutânea ou intramuscular.

BOVINOS: 1 mL para cada 10 kg de peso. A injeção intramuscular deverá ser feita profundamente no músculo (coxa) ou através da via subcutânea (nas áreas de pele solta do pescoço, na frente ou atrás da paleta) usando-se agulhas de calibre e comprimento apropriados. Não deve ser injetado mais de 10 mL em um mesmo local.

SUÍNOS: Animais pesando mais de 10 kg, aplicar 1 mL para cada 10 kg de peso e com mais de 100 kg, recomenda-se dividir a dose em dois locais de aplicação.

Não utilizar em suínos com menos de 10 Kg de peso vivo.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

OBSERVAÇÕES:

Após a administração do produto, pode ocorrer aumento de volume nos locais de aplicação, de caráter regressivo, desaparecendo em até duas semanas após o tratamento.

Uma simples dose será suficiente para um tratamento eficaz.

“A subdosagem interfere na eficácia do tratamento”.

“A Terramicina®/LA Solução Injetável pode se tornar escura com o tempo, porém sua atividade permanece inalterada”.

As dosagens podem ser alteradas à critério do médico veterinário.

Após a retirada da primeira dose, utilizar todo o conteúdo do frasco em 28 dias.