

Conteúdo: 1 frasco de vacina  
liofilizada contendo 10 doses,  
1 frasco de diluente estéril líquido  
contendo 20mL e uma cânula para aplicação

zoetis

## INFORCE™ 3










Vacina Viva Atenuada Contra Rinotraqueíte  
Infecciosa Bovina (IBR), Parainfluenza Tipo 3  
(PI3) e Vírus Sincicial Respiratório Bovino  
(BRSV)

### USO VETERINÁRIO

Uso intranasal

## INFORCE™ 3

## INFORCE™ 3

2,0 mL		IBR-PI <sub>3</sub> -BRSV
		
		
		
		

Licenciado no Ministério da  
Agricultura sob número 10.103 em  
22/06/2015.

#### PRODUTO IMPORTADO

Representante Exclusivo no Brasil,  
Importador e Distribuidor:  
Zoetis Indústria de Produtos  
Veterinários Ltda.

Rua Luiz Fernando Rodriguez, 1701,  
CEP 13084-798 - Campinas - SP  
CNPJ 43.588.045/0001-31  
Responsável Técnica: Vanessa da  
Silva Lopes - CRMV SP nº 28.204  
SAC: 0800 011 1919

Proprietário e Fabricante:  
Zoetis Inc., Lincoln, NE, E.U.A.  
U.S. Vet. License No.190

## INFORCE™ 3

Para vacinação de bovinos saudáveis, incluindo vacas prenhes, para a prevenção de doença respiratória causada por Vírus Sincicial Respiratório Bovino (BRSV), e auxiliar na prevenção de Doença Respiratória causada por Vírus da Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR) e Vírus da Parainfluenza Bovina (PI3).

**Composição:** Contém Vírus da Rinotraqueíte Infecciosa Bovina cepa RLB 106 (amostra termo-sensível), Vírus da Parainfluenza Bovina tipo 3, cepa RLB 103 (amostra termo-sensível) e Vírus Sincicial Respiratório Bovino cepa BRSV/375 (amostra viva modificada).

**Modo de uso:** Vacinar bovinos saudáveis, inclusive fêmeas prenhes. Reidratar de forma asséptica a fração liofilizada com o diluente estéril fornecido, agitar bem, e administrar 2 mL por animal, pela via intranasal (IN), usando cânula ou seringa sem agulha. Administrar metade da dose (1 mL) em cada narina. Bezerros vacinados antes dos 6 meses de idade devem ser revacinados após os 6 meses de idade para evitar possível interferência dos anticorpos maternos no processo de imunização. Recomenda-se revacinação anual com dose única.

**Precauções:** Armazenar sob refrigeração em temperatura de 2° C a 8° C. Não congelar. A exposição prolongada a temperaturas mais altas e/ou à luz solar direta pode afetar adversamente a potência. Usar todo o conteúdo após aberto. Usar seringas e cânulas estéreis para administrar a vacina. Não esterilize os materiais que entrarão em contato com a vacina com agentes químicos, pois resíduos de desinfetantes podem inativar a vacina. Incinerar frascos e conteúdo não utilizado. Não vacinar nos 21 dias que antecedem o abate. Contém gentamicina como conservante. Como qualquer vacina, reações de anafilaxia podem ocorrer após o uso. O antídoto inicial é epinefrina e deve ser acompanhado de terapia de suporte apropriada. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

zoetis