

# Alatox®

**Bernicida, mosquicida e carrapaticida para bovinos**

## USO VETERINÁRIO

Alatox® é um concentrado emulsionável, contendo 450 g/litro de Diclorvos: Dimetil-2,2-diclorovinil fosfato e 50 g/litro de Cipermetrina: Alfa-ciano 3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2,2 diclorovinil) ciclopropano carboxilato.

Alatox® é facilmente emulsionável em água para uso em pulverização através de pulverizadores manuais ou motorizados.

### ATENÇÃO:

#### OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA

##### BOVINOS:

**ABATE:** O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 24 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

**LEITE:** O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS TRATADOS.

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

**Indicações:** Eficaz no controle de bernes (larvas da *Dermatobia hominis*), carrapatos (*B. microplus*), mosca-do-chifre (*Haematobia irritans*).

**Poder residual:** 7 dias para bernes; 21 dias para carrapatos; 7 dias para mosca-do-chifre.

#### Instruções de Uso:

**Dose:** Diluir Alatox® em água na proporção de 1:400 (1 litro em 400 litros de água) ou de acordo com a tabela de doses abaixo:

Alatox®	Água	Alatox®	Água	Alatox®	Água
10 mL	4 litros	50 mL	20 litros	250 mL	100 litros
20 mL	8 litros	100 mL	40 litros	500 mL	200 litros
40 mL	16 litros	200 mL	80 litros	1000 mL	400 litros

Para grandes volumes de calda (acima de 50 litros), recomenda-se preparar uma pré-mistura em um balde plástico a parte, usando-se a dose recomendada em 8 litros de água. Agitar vigorosamente até completa homogeneização e despejar para dentro do pulverizador, completando-se o volume com água limpa, sempre sob agitação.

**Modo de Aplicação:** Pulverizar todo o corpo do bovino, utilizando ao redor de 3 a 5 litros de calda por animal. Além da infestação de bernes e caso haja também uma intensa infestação de carrapatos e moscas-do-chifre, pulverizar inclusive as partes mais atacadas como barbeta, axilas, ventre, virilhas, entremembros e inserção da cauda.

**Intervalo entre Tratamento:** Ao redor de 25 a 30 dias para bernes e carrapatos e de 30 a 60 dias para mosca-do-chifre.

**Recomendações na Aplicação:** • Não é recomendável pulverizar animais debilitados, sedentos ou exaustos, bem como nas horas mais quentes do dia ou sob sol intenso. • Não utilizar o produto associado a outros organofosforados ou diluído em óleo de qualquer origem. • Usar pulverizadores (manuais ou motorizados) com boa pressão e testar para detectar se há vazamentos que, se existentes, devem ser sanados. • Aplicar sobre os animais contidos em locais abertos e arejados. • Tratar as vacas leiteiras sempre depois da ordenha. • Lavar o úbere das vacas tratadas antes da ordenha. • Pulverizar os animais sempre a favor do vento. • Não pulverizar sobre rações animais ou alimentos. • Evitar o contato com a pele e a inalação prolongada. • Após o trabalho, lavar as mãos e as partes expostas do corpo com água e sabão, antes de comer, beber ou fumar.

**Precauções no Manuseio do Produto:** • Antes de abrir as embalagens, manusear e aplicar o produto, ler atentamente as instruções de uso impressas no rótulo. • Na manipulação do produto concentrado, vestir macacão, botas, luvas e máscara protetora para o rosto. • Abrir as embalagens em local arejado e longe de qualquer chama. • Não misturar o produto com cal. • Não comer, beber ou fumar durante o preparo da calda. • Evitar o contato do produto com a pele, olhos e boca. • Os equipamentos e materiais de manipulação não poderão servir para outros fins e devem ser lavados com água e sabão após a sua utilização, inclusive a roupa usada. • Destruir as embalagens vazias ou enterrá-las longe de mananciais de água. • Não contaminar rios, riachos, lagos e lagoas.

**Conservação:** O produto deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar.

#### Período de Utilização:

**50 mL:** Após aberto utilizar todo o conteúdo.

**100 mL:** Após aberto utilizar todo o conteúdo em até 8 dias.

**500 mL e 1000 mL:** Após aberto utilizar todo o conteúdo em até 30 dias.

#### Primeiros Socorros:

**Intoxicação pelo DDVP:** O DDVP é um organofosforado inibidor da colinesterase. Aplicar imediatamente, 2-4 mg de Sulfato de Atropina e controlar periodicamente o nível de colinesterase no sangue. Vigiar a respiração, e caso necessário, aplicar a respiração artificial.

**Intoxicação pela Cipermetrina:** Não há antídoto. Tratar sintomaticamente. O produto possui baixa toxicidade pelas vias oral e dérmica. Se for ingerido, efetuar lavagem estomacal, a critério médico.

**TELEFONE DE EMERGÊNCIA  
PARA USO MÉDICO:  
0800 014 8110**



**CUIDADO VENENO**