

zoetis

Ganadol®

USO VETERINÁRIO

Pomada cicatrizante e anti-infecciosa

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS

ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS TRATADOS.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 1 DIA APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Ganadol® é uma pomada que reúne em sua fórmula a quimioterapia específica de certos agentes, o poder histopoiótico e cicatrizante de outros, além de possuir antibióticos de alto poder bactericida e bacteriostático.

São 3 os seus componentes principais:

1. Ureia, que dissolve e elimina as secreções purulentas e os tecidos mortos, "limpando" a ferida e permitindo, deste modo, a ação profunda dos antibióticos sobre os germes da infecção.

2. A Penicilina, um antibiótico que tem ação predominante sobre determinados microrganismos, especificamente os germes gram-positivos como os estafilococos e estreptococos, agentes comuns da supuração, ou seja, *Streptococcus* spp., *Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus epidermitis*, *Staphylococcus aureus*. Também faz exercer essa ação sobre numerosos bacilos (*B. anthracis*, *Bacillus* spp.) bem como *Pasteurella* spp. e *Corynebacterium* spp.

Cria, portanto, nas feridas, um meio altamente impróprio ao desenvolvimento da infecção.

3. A Diidroestreptomicina tem ação predominante sobre os germes gram-negativos pouco sensíveis à penicilina (*E. coli*, *Klebsiella* spp., *Salmonella* spp., *Shigella* spp.), podendo, entretanto, atuar também sobre alguns organismos gram-positivos penicilino-resistentes (*Staphylococcus* spp., *Actinobacillus* spp.). A associação com a penicilina é reconhecidamente sinérgica, isto é, produz maiores efeitos do que a soma dos resultados dos dois antibióticos isolados.

Fórmula:

Pomada anti-infecciosa e cicatrizante

Cada bisnaga de 50 g contém:

Penicilina G benzatina.....	1.250.000 UI
Penicilina G procaína.....	1.250.000 UI
Diidroestreptomicina (sulfato)	1,25 g
Ureia	2,50 g
Excipiente q.s.p.....	50 g

Indicações:

Deve ser usada em cortes, escoriações, nas feridas resultantes de castrações e outras operações, no tratamento de feridas infectadas e supurações de qualquer tipo. Não utilizar Ganadol® em tetos de vacas produzindo leite para o consumo humano.

Aplicação:

Lavar a parte doente com água morna pura. Fazer em seguida a aplicação de Ganadol® em quantidade tal que recubra a ferida. Cobrir, se possível, com uma tira de gaze. Renovar o curativo todos os dias com as mesmas precauções até cicatrização completa.

Precauções:

O produto deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegido da luz solar.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Validade do produto: 24 meses após a data de fabricação.

Responsável Técnico: Dr. Renato Beneduzzi Ferreira

Médico Veterinário - CRMV-SP nº 1695

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 1.598, em 04/05/60.

Fabricante:

Ipanema Indústria de Produtos Veterinários Ltda.

Rodovia Raposo Tavares, km 113 - Araçoiaba da Serra - SP

zoetis

Proprietário:

Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda.

Rua Luiz Fernando Rodriguez, 1701

CEP 13064-798 - Campinas - SP

CNPJ 43.588.045/0001-31 - Indústria Brasileira

SAC 0800 011 1919