

COLOSSO POUR ON

USO VETERINÁRIO

Ectoparasiticida de ampla ação

Fórmula:

Cada 100 mL contém:


Cipermetrina	5,00 g
Clorpirifós	7,00 g
Veículo q.s.p.	100 mL

Indicações:

O produto é indicado para o tratamento de infestações causadas por berne (larvas de *Dermatobia hominis*), carrapato (*Rhipicephalus Boophilus microplus*) e mosca-dos-chifres (*Haematobia irritans*) de bovinos.

Modo de Uso e Dosagem:

Aplicar o produto pela via tópica (pour on) em toda linha dorsal dos bovinos, do meio do pescoço até a inserção da cauda.



A dose recomendada é de 10 mL para cada 100 kg de peso corporal, equivalente a 5 mg de

cipermetrina e 7 mg de clorpirifós/kg, conforme tabela abaixo:

Peso (kg)	Volume de Colosso Pour On (mL)
100	10
200	20
300	30
400	40
500	50
600	50
700	50

A dosagem máxima recomendada do produto **Colosso Pour On** é de 50 mL, sendo assim, para animais com peso corporal acima de 500 kg, aplicar 50 mL.

A aplicação do carrapaticida deve ser feita individualmente, com o animal contido de maneira adequada, garantindo a segurança do animal e do aplicador.

As práticas de manejo existentes em cada propriedade, como a rotação de pastagens, instalações, densidade animal, sexo, assim como características genéticas ou raciais, podem

influenciar na incidência de parasitas e, conseqüentemente na eficácia do produto. Assim, cada propriedade rural poderá apresentar necessidades diferentes para o controle parasitário, sendo recomendado o controle integrado e estratégico de parasitas, a ser definido pelo médico-veterinário.

Precauções em humanos:

Cuidado! Irritante para os olhos, pele e mucosa. Evitar o contato com a pele, os olhos e a boca. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consultar um médico, levando a embalagem completa do produto.

Perigo! Causa danos se ingerido. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito, consultar um médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

Durante a utilização do produto, proteger-se com roupas, luvas de borracha (luva nitrílica) e máscara adequados. Não manusear o produto com as mãos desprotegidas.

Após a aplicação do produto, remover as luvas e lavar bem as

mãos e partes expostas do corpo.

Não aplicar sobre pessoas, e alimentos e/ou culturas agrícolas. Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos.

Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.

Não misturar a outros produtos.

Em caso de intoxicação acidental procurar socorro médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente. Produto tóxico para peixes. Não contaminar coleções de água de qualquer natureza.

Precauções em animais:

Evitar a aplicação em animais debilitados, exaustos ou estressados.

Evitar aplicar o produto em horas de calor intenso ou em dias chuvosos, pois essas condições não foram avaliadas.

Obedecer às dosagens recomendadas para uso do produto.

Reações Adversas:

Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer.

Interações Medicamentosas:

A atividade inseticida dos piretroides pode ser aumentada com a adição de algumas substâncias que potencializam os efeitos tóxicos destes sobre os mamíferos. Os sinérgicos mais comuns usados em formulações de piretroides são o butóxido de piperolina, o

N-octil-diciclo-hepteno-dicarboximida (MGK 264), o sulfóxido, o sesomim e o sesomolim.

A presença de outros compostos químicos como, por exemplo, medicamentos que possuem propriedades bloqueadoras neuromusculares, tais como anestésicos voláteis, íon de magnésio, outros agentes bloqueadores neuromusculares e medicamentos que competem com os organofosforados por esterases-alvo (succinilcolina,

fenotiazina e procaína), podem alterar a toxicidade dos organofosforados.

Advertências:

Seguir as orientações desta bula para utilização do produto. Não foram conduzidos estudos de segurança em fêmeas prenhes e lactantes e em machos em atividade reprodutiva.

Contraindicações e limitações de Uso:

Não administrar em pele lesionada.

Não administrar em animais com hipersensibilidade conhecida aos compostos do produto.

Não aplicar em animais com menos de três meses de idade.

Não utilizar produto com prazo de validade vencido.

Informações para uso médico:

Grupo químico: Piretroides sintético/Composto organofosforado;

Ingrediente ativo:

Cipermetrina/Clorpirifós;

Ação Tóxica: Hipersensibilizante, irritante das mucosas/Inibição da enzima colinesterase;

Antídoto/Tratamento:

Anti-histamínicos e efetuar tratamento sintomático/Sulfato de atropina e reativadores de

colinesterase.

Em caso de intoxicação humana, procurar auxílio médico imediatamente, levando a embalagem do produto.

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS
SEGUINTE PERÍODOS DE
CARÊNCIA**

BOVINOS

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS
TRATADOS COM ESTE PRODUTO
SOMENTE DEVE SER REALIZADO
69 DIAS APÓS A ÚLTIMA
APLICAÇÃO.**

**LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS
TRATADOS COM ESTE PRODUTO
NÃO DEVE SER DESTINADO AO
CONSUMO HUMANO ATÉ 7 DIAS
APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO
DESTE PRODUTO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM
CONDIÇÕES DIFERENTES DAS
INDICADAS NESTA BULA PODE
CAUSAR A PRESENÇA DE
RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES
APROVADOS, TORNANDO O
ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL
IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Conservar o produto em sua

embalagem original, em local seco e fresco, em temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Após aberto, o produto deverá ser utilizado em até 06 meses, desde que mantido em condições adequadas de armazenamento.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 8.440 em 13/01/2003.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della
Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508



Leia o QR code e
acesse nosso
Áudio Bula.

CUIDADO  **VENENO**

KIT 50005752/10

KIT 50005755/06

KIT 50005760/04

Proprietário e Fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria Brasileira



  **Ouro SAC**
16 3518 2025
Telefone ou WhatsApp
(seg. a sex. das 8h às 17h)



 **ourofino**
saúde animal