

# Formoped®

## USO VETERINÁRIO

### Indicações:

Podridão dos pés (foot rot, Piétin) dos ovinos.  
Podridão dos cascos dos bovinos (foot rot).  
Frieiras em geral. Lesões necróticas dos pés.  
Papilomatose bovina (figueira).



#### **ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA**

##### **BOVINOS:**

ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE BOVINOS TRATADOS. LEITE: O LEITE DE ANIMAIS TRATADOS COM O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA CONSUMO.

##### **OVINOS:**

ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE OVINOS TRATADOS. LEITE: O LEITE DE ANIMAIS TRATADOS COM O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA CONSUMO.

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

### Fórmula:

Cada 100 mL contém:

M. M. D. H. (Monometilol dimetil hidantoína) ..... 275 g

Veículo q.s.p. .... 100,0 mL

Propelentes:butano:propano (90:10)

### Recomendações para o uso:

Aplicar Formoped® cobrindo toda a área afetada. Repetir o tratamento quando necessário. Nos casos de papilomatose bovina (figueira), fazer aplicações diárias nas verrugas maiores, durante 10 dias. Pode ser associada ao tratamento, com produto à base de Terramicina. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não contém clorofluorcarbono.

### Informações para uso médico:

**O princípio ativo ao entrar em contato com a pele e outros tecidos desprende formalina, podendo ser tóxico, causar queimaduras e alergias em seres humanos.**

### Precauções:

Não aspirar e não pulverizar o produto nos olhos ou na pele. Caso isso ocorra, lavar os olhos com água e a pele com água e sabão. Se houver irritação ou ardor local, procure o médico. **levando a embalagem do produto.** Conteúdo sob pressão, não fure nem incinere o tubo, mesmo vazio. Produto inflamável. Não usar ou guardar em lugar quente, próximo a chamas ou exposto ao sol.