

MORAK 5

Vacina Inativada contra a Ceratoconjuntivite Infecciosa Bovina

Uso Veterinário

COMPOSIÇÃO:

Uma dose (3 ml) contém:

Moraxella bovis sorotipo C $\geq 6 \times 10^6$ microorganismos

Moraxella bovis sorotipo D $\geq 6 \times 10^6$ microorganismos

Moraxella bovis sorotipo E $\geq 6 \times 10^6$ microorganismos

Moraxella bovoculi $\geq 6 \times 10^6$ microorganismos

Moraxella ovis $\geq 6 \times 10^6$ microorganismos

Suspensão injetável.

INDICAÇÃO E FINALIDADE DE USO:

Vacina para a prevenção da Ceratoconjuntivite Infecciosa Bovina.

CONTRA-INDICAÇÕES:

Não usar em caso de hipersensibilidade aos antígenos, adjuvantes ou excipientes.

Em caso de anafilaxia pela administração da vacina, recomenda-se tratamento com epinefrina (adrenalina), na dose de 0,01 mg/kg de peso corporal, associado a um tratamento sintomático.

Não usar a vacina em animais enfermos, coalescentes ou em outras situações que possam causar estresse.

REAÇÕES ADVERSAS:

Pode ocorrer inflamação leve no local de injeção que persiste por até 48 horas na maioria dos casos;

Pode ocorrer um aumento leve e transitório da temperatura corporal durante as 6 primeiras horas após a injeção, e que desaparece espontaneamente em 24 horas sem comprometer a saúde geral do animal;

Se for notado algum efeito adverso ou outro efeito não mencionado na bula, informar o médico veterinário.

ESPÉCIE DE DESTINO:

Bovinos a partir dos 3 meses de idade.

POSOLOGIA E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

Administrar uma dose de 3 mL por via subcutânea (SC) de acordo com o seguinte esquema:

Administrar 2 doses da vacina, com um intervalo de 21 dias. Administrar uma dose reforço a cada 6 meses.

Via subcutânea (SC).

Agitar o frasco antes de utilizar.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO:

Manter fora do alcance das crianças;

Conservar sob refrigeração, na temperatura entre 2 °C e 8 °C;

Não congelar;

Manter o frasco na embalagem externa;

Não usar depois da data de validade que consta no rótulo;

Não armazenar o produto junto a alimentos, bebidas, produtos de limpeza e higiene;

Manter o produto na sua embalagem fechada;

Manter o produto em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar;

A vacina deve estar na temperatura entre 15 °C a 25 °C para a aplicação.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM ANIMAIS:

Vacinar apenas animais saudáveis.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS QUE DEVEM SER TOMADAS PELA PESSOA QUE ADMINISTRA O MEDICAMENTO AOS ANIMAIS:

Em caso de uma auto-injeção acidental procurar o médico imediatamente levando a bula do produto.

UTILIZAÇÃO DURANTE A REPRODUÇÃO E GESTAÇÃO:

Pode ser usado durante o período reprodutivo e gestação.

INTERAÇÕES COM OUTROS PRODUTOS:

Não apresenta informação disponível de segurança e eficácia desta vacina quando usada com outros produtos veterinários. A decisão do uso desta vacina antes ou após a administração de outro produto veterinário deve ser analisada caso a caso.

SOBREDOSAGEM:

Não produz efeitos adversos secundários diferentes dos encontrados em reações adversas.

INCOMPATIBILIDADES:

Não misturar com nenhum outro produto veterinário.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS PARA A ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO NÃO UTILIZADO OU, OS RESÍDUOS DERIVADOS DO SEU USO:

O produto veterinário não utilizado ou resto de material deve ser descartado de acordo com as exigências locais.

APRESENTAÇÃO:

Caixa com 1 frasco de plástico de 90 mL correspondente a 30 doses.

Venda e aplicação sob orientação do médico veterinário.

Licenciado no MAPA sob nº. 10.167 em 26/11/2015.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Proprietário e Fabricante:

HIPRA SAÚDE ANIMAL Ltda.

Av. do Lami, 6133. Bairro Lami. Porto Alegre-RS.

CEP 91782-601

CNPJ nº. 92.662.501/0001-51 IE nº. 096/0531289

E-mail: brasil@hipra.com – Site: www.hipra.com

Resp. Téc.: Charles F.C. Scherer – CRMV-RS 07316

SAC:08006444501



HIPRA SAÚDE ANIMAL LTDA. Avenida do Lami, 6133 - Bairro Lami - Porto Alegre - RS - Brasil

91782-601 - Tel: (51) 33254500 - Fax: (51) 33254528 - brasil@hipra.com - www.hipra.com